



メファキン (Mephaquin)

マラリア予防薬及び治療薬として、日本で唯一認可を受けている薬

商品名称(一般名称)	メファキン(メフロキン)
英語表記	Mephaquin (Mefloquine)
服用方法	体重45Kg以上の成人:1週間に1錠服用 (体重5~45Kgの方:5mg/Kg(体重)服用)
服用期間	マラリア危険地帯に入る1週間前から服用開始し、 危険地帯を出てから4週間服用を続ける
メリット	・日本で唯一認可を受けている薬 ・週1回の服用なので服用合計錠が少ない
デメリット	・精神神経症状の副作用が比較的多く見られる 【主な副作用】嘔気、腹部膨満感、胃部不快感、めまい、ふらつき、頭痛、蕁麻疹、精神障害、平衡感覚異常等

禁忌

- メフロキン過敏症、うつ病などの精神疾患、痙攣性疾患の患者と既往者、重症の精神神経疾患既往者、ハロファントリン服用者、不整脈のある方、メフロキン治療後4週間以内、飛行機の操縦や機器類の操作をする方、妊娠初期の妊婦など。


NOTE:

- タイ、カンボジア、ミャンマーなどメフロキン耐性マラリアが存在する地域では使用不可。
- 体重5kg未満の幼児についての安全性に関するデータがありません。
- 授乳には支障がない。
- 妊娠中期(second trimester(妊娠15~28週))と妊娠後期(third trimester(妊娠29~40週))の方は服用可能。
- 薬を服用中及び最後に薬を服用してから3ヶ月間は必ず避妊する。

Access 品川駅より徒歩5分 港南口 直結
品川インターシティ内

品川駅港南口から品川インターシティ方面に進み、B棟にお入り下さい。
B棟に入り少し進むと左手にATMがあり、その隣に当クリニックはあります。

品川駅からは直結していますので、同じ階(2階)になります。



品川イーストクリニック

〒108-6102

東京都港区港南2-15-2
品川インターシティB棟2階

Tel: 03-5783-5521

Fax: 03-5783-5523

E-mail: shinagawa@e-clinic.gr.jp

<http://e-clinic.gr.jp>

<http://izavel.com>

マラリア流行地へ
行かれる方へ

マラリア予防薬

- ・マラロン
- ・メファキン
- ・ビブラマイシン

Prevention Malaria

- ・Malarone
- ・Mephaquin
- ・Vibramycin

上記の予防薬を常備しております。
処方をご希望の方はお電話下さい。

The above mentioned medications
are always available.
Please call us for prescriptions.

※DEETの取り扱いもございます。※DEET is also available.

 品川イーストクリニック
Shinagawa East Medical Clinic

トラベルクリニック・予防接種

- トラベルクリニック
- 予防接種/予防薬
- 常備薬
- 健康診断
- 英文証明書